

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Шандонг Люкси Энимал Медисин Шер Ко.Лтд
Лю Шангдэ
«09» июля 2022 г.



ИНСТРУКЦИЯ по применению препарата ДестраЛарв.

Торговое наименование: ДестраЛарв (DestraLarv).

Состав и форма выпуска:

Инсектицидный препарат. Выпускается в форме водорастворимого порошка белого цвета без запаха. В качестве действующего вещества содержится:

-Циромазин 50%.

Вспомогательные вещества: Карбонат натрия и Бикарбонат натрия, Полиэтиленгликоль (тетраметилбутил), фенилового эфира и силиконового масла- до 1 г. Растворимый в воде.

Расфасован в пакеты из ламинированной фольги по 1 кг, 5 кг или в ведро по 5 кг и упакован в картонные коробки, мешки или картонные бочки по 10 кг или 25 кг.

Фармакологические (биологические) свойства и эффекты

Инсектицидный препарат. Циромазин, входящий в состав препарата, является регулятором роста насекомых, действует на личинок насекомых путем ингибирования синтеза хитина. *Активен в отношении личинок* обитающих в животноводческих помещениях мух, включая *Musca spp.*, *Stomoxys calcitrans*, *Drosophila spp.*, *Lucilia spp.*

Под действием циромазина нарушается процесс развития личинки, которая погибает до превращения во взрослую особь. ДестраЛарв® 50 SP не действует на куколку и взрослую особь.

ДестраЛарв® 50 SP по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

Показания к применению препарата ДестраЛарв®

- дезинсекция животноводческих помещений, других объектов ветеринарного надзора против личинок мух.

Порядок применения

Препаратом обрабатывают места размножения насекомых. Не подлежат обработке места скопления насекомых (потолки, стены и т.д.), т.к. ДестраЛарв® не действует на взрослых особей.

ДестраЛарв применяют путем опрыскивания или смачивания мест размножения насекомых раствором препарата из расчета 0.5 г ДВ на 1 м² поверхности.

Метод опрыскивания включает в себя приготовление раствора препарата и опрыскивание поверхностей мест размножения мух с помощью механического или автоматического оборудования для распыления.

Метод смачивания предполагает обработку мест размножения насекомых раствором препарата с помощью лейки.

Одновременной обработке подлежат все места размножения насекомых.

Нормы расхода препарата на 10 м² поверхности представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Тип помещения	Количество препарата Дестраларв® для обработки 10 м ² поверхности	
Коровники		
<p><i>Глубокая подстилка:</i> Обработать полосу шириной около 50 см вдоль стен, вокруг и под стойлами, где подстилка не утаптывается животными, обработать края и области разлива вокруг кормушек и поилок, места скопления навоза.</p> <p><i>Домики для телят на улице:</i> Обработать все поверхности путем распыления или смачивания примерно через 3 дня после удаления навоза. Повторять обработку после каждого удаления навоза или обнаружения личинок мух.</p> <p><i>Коровники с решетчатым полом:</i> Обработать всю поверхность пола сразу после очистки навозной ямы. Повторять обработку после каждого удаления навоза или обнаружения личинок мух.</p>	Смачивание 10 г на 7.5 л воды	Опрыскивание 10 г на 2.5 л воды
Свинарники		
<p><i>Решетчатый пол:</i> Обработать всю поверхность пола сразу после очистки навозной ямы. Повторять обработку после каждого удаления навоза или обнаружения личинок мух.</p> <p><i>Система все пусто - все занято:</i> Обработать путем сухого распыления немедленно после уборки помещения, до постановки животных.</p> <p><i>Глубокая подстилка:</i> Обработать путем опрыскивания или смачивания через 3 дня после удаления навоза. Повторять обработку после каждого удаления навоза или обнаружения личинок мух. Обработать всю поверхность навоза и области разлива вокруг кормушек и поилок.</p>	Смачивание 10 г на 7.5 л воды	Опрыскивание 10 г на 2.5 л воды
Птичники		
Обработать всю поверхность через 1 неделю после удаления помета. Повторять обработку после каждого удаления помета или обнаружения личинок мух.	Смачивание 10 г на 7.5 л воды	Опрыскивание 10 г на 2.5 л воды

Повторные обработки проводят через 2 недели.

Побочные эффекты

Не установлены.

Противопоказания к применению препарата Дестраларв

Запрещается обрабатывать инсектицидным раствором:

- кормушки;

- поилки;
- поверхности, с которыми будут контактировать продукты питания, корма и животные.

Особые указания и меры личной профилактики

Не рекомендуется использовать препарат в смеси с другими пестицидами.

Меры личной профилактики

Все виды работ с препаратом ДестраЛарв проводят, соблюдая общие правила гигиены и техники безопасности, с использованием средств индивидуальной защиты (хлопчатобумажный костюм или халат, резиновые перчатки, головной убор, респиратор и защитные очки).

К работе не допускаются беременные и кормящие грудью женщины, лица моложе 18-летнего возраста и имеющие противопоказания для работы с инсектицидными средствами.

При приготовлении и применении рабочего раствора препарата **ДестраЛарв**® 50 SP следует избегать пыления и попадания порошка или раствора на кожу, в глаза, органы дыхания и внутрь.

В случае загрязнения на рабочих поверхностях продуктом или рабочим раствором, их следует тщательно очистить, соблюдая правила защиты окружающей среды, собрав раствор или порошок в соответствующую емкость для дальнейшей утилизации.

Условия хранения ДестраЛарв

Препарат следует хранить в закрытой упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре от 2° до 30°С.

Срок годности ДестраЛарв

Срок годности при соблюдении условий хранения - 5 лет со дня изготовления.

Неиспользованный препарат или его рабочий раствор уничтожают отдельно от бытовых отходов в специально отведенных местах, вдали от источников питьевой воды и водоемов.